



Triflène

**Erbicida di pre-emergenza
contro le infestanti
graminacee e dicotiledoni
delle colture orticole,
frutticole e del frumento**

Composizione	Trifluralin puo (480 g/l.)	44,8%
Formulazione	Liquido emulsionabile	Tempo di carenza 30 gg. per tutte le colture.
Confezioni	1 lt.	
Registrazione	n° 9664 del 15.06.1998	
Indicazioni di rischio	Xi irritante	

Caratteristiche

Triflène è erbicida selettivo per numerose colture orticole, frutticole e per il frumento. Si impiega in pre-emergenza delle colture, l'attività si manifesta esclusivamente come antigerminello, impedendo l'emissione della plantula o devitalizzandola appena nata. **Triflène** ha azione molto modesta sull'apparato radicale, nulla su quello aereo. Ad esclusione del frumento, si consiglia un interrimento di 3-5 cm., subito dopo l'applicazione, in quanto il prodotto è fotolabile. Persiste nel terreno per qualche mese.

Modalità d'impiego

Infestanti	Colture	Dosi (Kg/ha)	Epoche d'impiego
Graminacee: Digitaria Giavone Giavone americano Poa Setaria Sorghetta da seme	Frumento, Orzo, Segale a semina autunnale Pre-trapianto (Pomodoro, Peperone, Indivia, Lattuga, Scarola, Carota, Finocchio, Sedano, Prezzemolo, Cavolo, Cavolfiore, Cipolla, nonché su nuovi impianti di Vite, Agrumi, Melo, Pero, Drupacee, Ornamentali)	1,2-2 1,2	Si impiega in pre-emergenza delle colture. Impiegare le dosi maggiori nei terreni argillosi. Si impiega in pre-impianto in un periodo compreso tra 6 settimane ed un giorno prima, previo interrimento. Ornamentali con piante di 1 anno. Impiegare la dose più bassa su terreni leggeri, quella più alta su terreni argillosi.
Dicotiledoni annui: Amaranto Atriplice Chenopodio Erba porcellana Fumaria Galli Lamio Ortica Papavero Veronica Stellaria	Pre-semina (Aglione, Carota, Cavolo, Prezzemolo, Fagiolo, Fagiolino, Finocchio, Sedano, Soia, Girasole, Arachide, Colza, Ravizzone, Cotone, Gladiolo, Pisello) Post-emergenza (Vite, melo, Pero, Agrumi, Ornamentali) Pomodoro Melone, Cocomero, Cetriolo Carciofo Asparago	1,2 2 1,2-1,5 1,2 1-1,5 1,2	Si impiega in pre-semina interrando il prodotto da 6 settimane ad un giorno prima della semina. Su Gladiolo fare il trattamento su bulbi con diametro di 2,5 cm. Su impianti già radicati con interrimento immediato del prodotto. Irrorare ed interrare tra le file all'epoca del diradamento. Applicare ed incorporare al momento del diradamento allo stadio di 3-4 foglie. Prima dell'impianto dei carducci e dopo l'impianto degli ovuli, interrando. Applicare ed incorporare prima del ricaccio.

* Impiegare a dosi di 1l/ha su terreni sciolti - 1,5 l/ha su terreni medio impasto - 2 l/ha su terreni argillosi.

Vantaggi

Elevata attività antigerminello. Lunga persistenza. Selettività per le colture.

Compatibilità

È miscibile specie con **Linuron** per il diserbo di pre-emergenza dei cereali autunno-vernini.

Fitotossicità

Qualora fosse necessaria una ricoltivazione, devono passare almeno 5 mesi fra l'applicazione del **Triflène** e la semina di Frumento, Orzo, Segale, Mais, Sorgho, piccole graminacee foraggere, Pomodoro, Erba medica, Trifoglio, Melone, Cocomero, Cetriolo, Zucca, Insalata, Tabacco, Cipolla, Patata, Colza, Cavoli, Spinacio. Non seminare Bietola (da zucchero, da foraggio, da orto ecc.) nella primavera successiva all'applicazione del prodotto. Non deve essere applicato sui terreni contenenti l'8% o più di sostanza organica, in quanto perde di efficacia.

Avvertenze

Intervenire nelle ore più fresche della giornata. Impiegare 300-600 litri di soluzione /ha.